

LORADAY

LORATADINE

Name of the Product

LORADAY 10 mg Tablets.
LORADAY Syrup.

Composition

LORADAY Tablets: Each tablet contains Loratadine 10 mg.
LORADAY Syrup: Each 5 ml contains Loratadine 5 mg.

Excipients:

Syrup: Citric acid monohydrate, sodium benzoate, sucrose, glycerin, propylene glycol, raspberry flavor and distilled water.

Tablets: lactose monohydrate, maize starch, povidone K-25, polysorbate 80, aerosil 200, talc powder and magnesium stearate.

Presentation

LORADAY 10 mg tablets are available in packs of 10 and 30 tablets.
LORADAY syrup is available in glass bottles size of 100 and 120 ml.

Indications

LORADAY is long-acting, non-sedating antihistamine with selective peripheral H₁-receptor antagonistic activity and does not have sedative effect at the recommended dose. LORADAY is used for the relief of symptoms associated with seasonal allergic rhinitis and chronic urticaria as well as other allergic dermatologic disorders.

Dosage and Administration

LORADAY Tablets:

- Adults and children above 6 years: one LORADAY tablet daily.

LORADAY Syrup:

- Children 2-5 years: one teaspoonful (5 ml) once daily.

- Adults and children above 6 years: 2 teaspoonful (10 ml) once daily.

Precautions

- Use with caution in patients with hepatic or renal impairment where dose adjustment should be considered.
- Safety and efficacy of Loratadine in children less than 2 years of age have not been established.
- It is not recommended to be used during pregnancy and breast feeding unless prescribed by the physician.

Contraindications

It is contraindicated in patients who have shown hypersensitivity to Loratadine or any other component.

Side Effects

LORADAY have no significant sedative effect when used in recommended dose. The most commonly side effects reported include: headache, fatigue, gastrointestinal disorders and dry mouth. It may cause also allergic symptoms like rash. Very rare side effects include: anaphylaxis, abnormal hepatic function, tachycardia, palpitation & alopecia.

Drug Interactions

Concomitant use with erythromycin, ketoconazole, cimetidine and antivirals such as amprenavir may increase plasma level of Loratadine.

Pharmacokinetics

Loratadine is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract after oral doses, peak plasma concentrations being attained in about 1 hour. Loratadine undergoes extensive metabolism. The major metabolite, desloratadine, has potent antihistaminic activity. Loratadine and its metabolites have been detected in breast milk. Most of the dose is excreted equally in the urine and faeces, mainly in the form of metabolites.

Over-Dosage

Symptoms of overdose include: somnolence, headache and tachycardia. Loratadine is not eliminated by dialysis and no specific antidote is available to date so the treatment should be symptomatic and supportive.

Storage Conditions

Store below 25°C, protect from light.

THIS IS A MEDICINE

- A medicine is a product that affects your health, and its consumption contrary to instructions is harmful to you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and instructions of the pharmacist who dispensed the medicine.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and harms.
- Do not stop taking this medication, unless advised by your doctor.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

Keep medicine out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers - Union of Arab Pharmacists



Kuwait Saudi Pharmaceutical Industries Co. K.S.C. (Closed) شركة الكويت للصناعات الدوائية. ص.ب: ٥٥١٤ - الصفاة - الرمزالبريدي، ١٣٠٥٦ دولة الكويت - صبحان - المنطقة الصناعية - هاتف: ٩٦٥ ٢٤٧٤٥٠١٢/٣/٤ - فاكس: ٩٦٥ ٢٤٧٤٥٣١١

P.O.Box: 5512 Safat - Postal Code: 13056 State of Kuwait - Subhan - Industrial Area - Tel: +965 24745012/3/4 - Fax: +965 24745361

www.kspico.com

لوراداي

لوراداي

اسم المنتج
أقراص لورادي ١٠ ملجم.
شراب لوراداي.

التركيب
أقراص لورادي : كل قرص يحتوي على ١٠ ملجم لوراتادين.
شراب لوراداي: كل ٥ مل تحتوي على ٥ ملجم لوراتادين.

السواغ:
الشراب: حامض الستريك أحادي الماء، بنزوات الصوديوم، سكروز، جليسرين، بروبيلين جليكول، نكهة التوت و ماء مقطر.
الأقراص: لاكتوز أحادي الماء، نشا الذرة، بوفيدون ك-٢٥، بوليسوربات ٨٠، إيروسيل ٢٠٠، بودرة التلك و ستيرات المغنسيوم.

العيوات
أقراص لوراداي متوفرة في عيوات من ١٠ و ٣٠ قرص.
شراب لوراداي متوفر في عيوات زجاجية حجم ١٠٠ و ١٢٠ مل.

دواعي الاستعمال
لوراداي مضاد هستاميني طويل المفعول ذو تأثير مضاد لمستقبلات (H₁) الطرفية ، ليس له أي تأثير مركن عندما يستخدم بالجرعة الموصى بها، يستخدم لوراداي للتخفيف من أعراض حساسية الأنف الموسمية وأعراض الارتيكاريا المزمنة بالإضافة إلى أمراض الجلد التحسسية.

الجرعة وطريقة الاستعمال
أقراص لورادي:
- للبالغين والأطفال ٦ سنوات وما فوق: قرص لورادي مرة واحدة يومياً.
شراب لورادي:
- للأطفال ٢- ٥ سنوات: ملعقة صغيرة (٥ مل) مرة واحدة يومياً.
- للبالغين والأطفال ٦ سنوات وما فوق: ملعقتان صغيرتان (١٠ مل) يومياً.

التحذيرات
- يستخدم بحذر للمرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكبد والكلبي مع ضرورة تخفيض الجرعة.
- الاستخدام الآمن والفعال للوراتادين من قبل الأطفال ما دون السننتين لم يثبت إلى الآن.
- لا يوصى باستخدامه خلال فترة الحمل والإرضاع مالم بوصف من قبل الطبيب المختص.

موانع الاستعمال
يمنع استخدامه في حالة المرضى الذين يعانون من الحساسية تجاه اللوراتادين أو تجاه أي من المكونات الأخرى.

الأعراض الجانبية
لوراداي لايسبب نعاس ملحوظ عندما يستخدم بالجرعة الموصى بها. أكثر الأعراض الجانبية التي وردت شملت: صداع، شعور بالتعب، اضطرابات معوية وجفاف في الفم.
وقد يسبب أعراض حساسية مثل: الطفح الجلدي. الآثار الجانبية نادرة الحدوث: إغوار (فرط الحساسية)، اضطراب وظائف الكبد، تسارع ضربات القلب، خفقان وسقوط الشعر.

التداخلات الدوائية
الإستخدام المتزامن للوراتادين مع الإريثرومايسين، الكيتوكونازول، السيميتيدين ومضادات الفيروسات كالأمبرينافير قد يزيد من تركيز اللوراتادين في بلازما الدم.

حركية الدواء
يمتص اللوراتادين سريعاً بعد تناوله، ويصل لذورة تركيزه في البلازما بعد ساعة تقريباً. يستقلب اللوراتادين في الكبد بشدة متحولاً إلى مستقلب فعال (الديسلورادادين) والذي يملك تأثير مضاد هستاميني قوي.
يفرز اللوراتادين ومستقلباته بشكل ملحوظ في حليب الثدي كما يتم طرح اللوراتادين ومستقلباته بشكل متساوي عن طريق البول والبراز.

الجرعة المفرطة
أعراض فرط الجرعة للوراتادين تشمل الوهن والصداع والزيادة في ضربات القلب.
الوراتادين غير قابل للدليزة ولايعرف له أي ترياق محدد حتى الآن، لذا في حال فرط الجرعة يجب أن يبدأ العلاج العرضي والمساعد فوراً.

التخزين
يحفظ في درجة حرارة أقل من ٢٥° مئوية، بعيداً عن الضوء.

أن هذا المستحضر " دواء "

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات قد يعرضك للخطر.
- اتبع إرشادات وصفة الطبيب بتطبيق طريقة الإستعمال على نحو صارم و دقيق وكذلك تعليمات الصيدلي الذي قام بصرفها أو بيعها لك.
- فالطبيب والصيدلي هما خبيران بنفع الدواء وضرره.
- لا توقف من تلقاء نفسك ودون مبرر مدة العلاج المحدد لك بموجب الوصفة الطبية.
- لا تكرر استعمال الدواء الموصوف لك دون استشارة طبية.

(حفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال)

مجلس وزراء الصحة العرب - اتحاد الصيدالة العرب



الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية. K.P.S.C (K.O.S.E.D) شركة

ص.ب: ٥٥١٢ الصفاة - البرماليبريدو: ١٣٠٥٦ دولة الكويت - صبحان - المنطقة الصناعية - هاتف: ٤٢٧٤٥٠١٢/٣ - فاكس: ٤٢٧٤٥٣١١ - ٩١٥
P.O.Box: 5512 Safat - Postal Code: 13056 State of Kuwait - Subhan - Industrial Area - Tel- +965 24745012/3/4 - Fax: +965 24745361

www.kspico.com